

Agro-Mn

8-0-0 avec 6% Mn + 0,5% Fe + 3,5% S

NUTRIMENT FOLIAIRE



description

■ **Agro-Mn** est un nutriment liquide conçu pour les applications au sol et sur le feuillage afin de prévenir et traiter les carences en manganèse. Le manganèse est complexé avec les acides organiques que l'on retrouve dans la plante, ce qui donne au produit un grand pouvoir d'absorption et de circulation dans la plante. **Agro-Mn** est renforcé en fer, en azote et en soufre afin de maximiser la photosynthèse, la production de biomasse et les rendements. Il peut être appliqué sur toutes les cultures sur la base d'analyses de sol et de tissus ou à l'apparition de symptômes de carences. Pour plus d'information sur **Agro-Mn**, consulter votre représentant agricole.

avantages agronomiques

- Manganèse et fer complexés avec les acides organiques pour une meilleure absorption
- Activité photosynthétique élevée
- Assimilation de l'azote
- Meilleure qualité et conservation des pommes de terre
- Formation des racines latérales
- Résistance aux maladies
- Résistance à la verse des céréales

densité 1,300 kg/L

Appliquer la dose suggérée ci-contre.

Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

Analyse minimale garantie

Azote total (N)	8 %	Fer (Fe) (réel)	0,5 %
Manganèse (Mn) (réel)	6 %	Soufre (S)	3,5 %

Dose gallon us/acre

Dose L/ha

Cultures

Moment d'application et remarques

Application au sol

Toutes	5-10	0,5-1,1	Faire une application en bande au moment de la plantation ou peu de temps après la plantation. Volume d'eau: au moins 50 L/ha (5,5 gallons US/acre).
--------	------	---------	--

Application foliaire

Blé, orge, avoine	2-4	0,2-0,4	Au tallage, répéter 14 jours plus tard au besoin.
Bleuet, canneberge	3-6	0,3-0,6	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Brocoli, chou, chou-fleur	2-5	0,2-0,5	7 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Carotte	2-3	0,2-0,3	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Céleri, laitue, épinard	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Concombre, courge, melon, cantaloup	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Fraise, framboise	2-4	0,2-0,4	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Maïs	2-4	0,2-0,4	Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Oignon, poireau	2-3	0,2-0,3	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme, poire	3-6	0,3-0,6	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme de terre	2-5	0,2-0,5	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après la floraison.
Soya, haricot, pois	2-4	0,2-0,4	Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Tomate, poivron, aubergine	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Vigne	2-5	0,2-0,5	2 semaines avant la floraison.

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec les engrais liquides et la plupart des pesticides. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage et élimination. Craint le gel. Ne pas empiler plus de trois contenants. **Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.** Conserver le contenant bien fermé, dans un endroit frais et aéré. Ne pas

appliquer directement aux cours d'eau et étangs. Ne pas contaminer l'eau par le rinçage d'équipement ou l'élimination des déchets.

Sécurité. Toujours porter des équipements de protection pour les mains et les yeux lors de la manipulation du produit. **En cas de contact avec les yeux,** rincer abondamment avec de l'eau, consulter un médecin. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau claire. **En cas d'ingestion, si la personne est consciente,** donner deux verres d'eau et induire le vomissement, consulter un médecin.

Avertissement. Ce produit renferme du manganèse et du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.