

Agro-Ammo

8-0-0 avec 9 % S

NUTRIMENT FOLIAIRE



description

■ **Agro-Ammo** contient de l'azote et du soufre et il est conçu pour les applications au sol, sur le feuillage et pour la fertirrigation. **Agro-Ammo** stimule la croissance et restaure la vigueur de la plante. Il peut être utilisé sur toutes les cultures sur la base d'analyses de sol et de tissus ou à l'apparition de symptômes de carences. Pour une meilleure utilisation de l'azote et du soufre par la plante, appliquer **Agro-Ammo** avec une solution d'azote selon un ratio N:S adéquat de 5:1. Pour plus d'information sur **Agro-Ammo**, consulter votre représentant agricole.

avantages agronomiques

- Maximise l'effet des herbicides (réduit l'effet de l'eau dure et autres métaux dans le mélange du réservoir)
- Excellente source de soufre
- Meilleure assimilation de l'azote
- Qualité des aliments (acides aminés, vitamines, huiles)
- Production de substances d'autodéfense
- Augmente le taux de protéines dans le blé
- Améliore la qualité du vin (azote assimilable dans les moûts, arômes)

densité **1,221 kg/L**

Appliquer la dose suggérée ci-contre.
Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre) pour les grandes cultures et maraîchères, 1000 L/ha (100 gallons/acre) pour les petits fruits et arbres fruitiers.

Analyse minimale garantie

Azote total (N)	8 %	Soufre total (S)	9 %
-----------------	-----	------------------	-----

Dose gallon US/acre	Moment d'application et remarques		
Dose L/ha			
Cultures			

Application au sol

Cultures	Dose L/ha	Dose gallon US/acre	Remarques
Arbres fruitiers	60-180	6,4-19,2	Au début de la saison de croissance.
Grandes cultures et maraîchères	15-180	1,6-19,2	Au moment de la plantation ou en saison. Appliquer en bande de 5 cm (2") sur le côté et 5 cm (2") en dessous de la semence ou à plus de 30 cm (12") des racines. L'azote en grande quantité peut inhiber la nodulation et diminuer la fixation symbiotique de l'azote.

Application foliaire

Cultures	Dose L/ha	Dose gallon US/acre	Remarques
Blé, orge, avoine	5-10	0,5-1,1	Au tallage, répéter à la floraison pour augmenter le taux de protéines.
Bleuet, canneberge	3-5	0,3-0,5	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Brocoli, chou, chou-fleur	5-10	0,5-1,1	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à la formation de la tête.
Carotte	3-6	0,3-0,6	2 ou 3 semaines après émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Céleri, laitue, épinard	3-5	0,3-0,5	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Concombre, courge, melon, cantaloup	3-5	0,3-0,5	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Cultures fourragères	5-10	0,5-1,1	Après chaque coupe.
Fraise, framboise	3-5	0,3-0,5	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Maïs sucré, maïs grain	5-10	0,5-1,1	Stade 6-8 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Oignon	5-10	0,5-1,1	2 ou 3 semaines après émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme, poire	4-6	0,4-0,6	Entre la préfloraison et le stade calice, répéter 10 jours après la chute des pétales. Ne pas appliquer plus tard qu'en juillet car la qualité des fruits et la survie hivernale pourraient être affectées. Ne pas appliquer plus de trois fois.
Pomme de terre	5-10	0,5-1,1	2 ou 3 semaines après émergence, répéter juste avant la floraison au besoin. Ne pas appliquer tardivement.
Soya, haricot, pois	5-7,5	0,5-0,8	Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Tomate, poivron, aubergine	3-5	0,3-0,5	Entre 7 et 14 jours après transplantation, répéter à la floraison.
Vigne	3-5	0,3-0,5	Lorsque les pousses ont entre 10-20 cm (4-8") et 30-40 cm (12-16") de longueur et à la véraison. Répéter à la véraison.

Fertirrigation

Cultures	Dose L/ha	Dose gallon US/acre	Remarques
Toutes	10-20	1,1-2,1	Mélanger avec les autres engrais et appliquer avec l'eau d'irrigation. La dose d'application varie selon la culture, le sol et la teneur du sol en azote et en soufre.

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Toujours appliquer quand il y a suffisamment de surface foliaire pour intercepter la pulvérisation. Ne pas appliquer lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des pesticides et des engrais liquides sauf les engrais contenant du calcium. Ne pas utiliser **Agro-Ammo** avec des pulvérisations à base d'huile. Lire attentivement les étiquettes des autres produits pour se familiariser avec le mode d'emploi des traitements qui contiennent de l'huile et des oligoéléments qui contiennent du soufre. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Entreposage et élimination. Craint le gel. Ne pas empiler plus de trois contenants. **Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.** Conserver le contenant bien fermé, dans un endroit frais et aéré. Ne pas appliquer directement aux cours d'eau et étangs. Ne pas contaminer l'eau par le rinçage d'équipement ou l'élimination des déchets.

Sécurité. Toujours porter des équipements de protection pour les mains et les yeux lors de la manipulation du produit. **En cas de contact avec les yeux,** rincer abondamment avec de l'eau, consulter un médecin. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau claire. **En cas d'ingestion, si la personne est consciente,** donner deux verres d'eau et induire le vomissement, consulter un médecin.

Avertissement. Ce produit ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.