

Mélangé et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Pour de meilleurs résultats, appliquer tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer sous des conditions desséchantes et lorsque la température extérieure est trop élevée sinon la culture pourrait être endommagée.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec les engrais liquides et la plupart des pesticides. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Mixing and application. Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. For best results, apply early in the morning or late in the evening. Do not apply under drying conditions and when outside temperature is too high otherwise culture may be damaged.

Compatibility. This product is compatible with liquid fertilizers and most pesticides. Check compatibility before mixing in application tank or check with your distributor. **Check compatibility as follow.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes líquidos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un

Entreposage. Craint le gel.

Avertissement. Ce produit renferme du manganèse et du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

Storage. Avoid freezing.

Caution. This product contains manganese and iron and should be used as stated by this label. It may prove harmful when misused.

Guarantee. The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este producto contiene manganeso y hierro y se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

Intervención: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Almacenamiento: Guardar bajo llave.

Eliminación: Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

NO REUTILICE EL CONTENEDOR

Agro-Mn™/MC

8-0-0 + 6% Mn + 0.5% Fe + 3.5% S



www.agro-100.com

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4 T 450 759-8887



Numéro d'enregistrement **2009044D** Loi sur les engrais du Canada
Registration number **2009044D** Fertilizers Act
Número de registro **2009044D** Ley sobre los abonos
Número de lot • Lot number • Número de lote:

Agro-Mn™/MC

8-0-0 + 6% Mn + 0.5% Fe + 3.5% S



Nutriment foliaire Foliar Nutrient Nutriente foliar

Nutriment foliaire / Foliar Nutrient / Nutriente foliar

DANGER

Risque avéré d'effets graves pour les organes (cerveau) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

Prévention: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit.

Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical. Consulter un médecin en cas de malaise.

Stockage: Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT



versión
en español
en el interior

DANGER

Causes damage to organs (brain) through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Do not breathe the mist, vapors and spray. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product.

Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice. IF exposed or concerned: Get medical advice. Get medical advice if you feel unwell.

Storage: Store locked up.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

DO NOT REUSE CONTAINER

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4



Agro-Mn™

8-0-0 + 6% Mn
+ 0,5% Fe + 3,5% S

Agro-Mn est un nutriment liquide conçu pour les applications au sol et sur le feuillage afin de prévenir et traiter les carences en manganèse. Le manganèse est complexé avec les acides organiques que l'on retrouve dans la plante, ce qui donne au produit un grand pouvoir d'absorption et de circulation dans la plante. **Agro-Mn** est renforcé en fer, en azote et en soufre afin de maximiser la photosynthèse, la production de biomasse et les rendements. Il peut être appliqué sur toutes les cultures sur la base d'analyses de sol et de tissus ou à l'apparition de symptômes de carences. Pour plus d'information sur **Agro-Mn**, consulter votre représentant agricole.

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

Analyse minimale garantie

Azote total (N)	8 %	Fer (Fe) (réel)	0,5 %
Manganèse (Mn) (réel)	6 %	Soufre (S)	3,5 %

Dose gallon US/acre		Moment d'application et remarques
Dose L/ha		
Cultures		

Application au sol

Toutes	5-10	0,5-1,1
Faire une application en bande au moment de la plantation ou peu de temps après la plantation. Volume d'eau : au moins 50 L/ha (5,5 gallons US/acre).		

Application foliaire

Cultures	Dose L/ha	Dose gallon US/acre	Moment d'application et remarques
Blé, orge, avoine	2-4	0,2-0,4	Au tallage, répéter 14 jours plus tard au besoin.
Bleuet, canneberge	3-6	0,3-0,6	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Brocoli, chou, chou-fleur	2-5	0,2-0,5	7 jours après transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Carotte	2-3	0,2-0,3	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Céleri, laitue, épinard	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Concombre, courge, melon, cantaloup	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Fraise, framboise	2-4	0,2-0,4	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Maïs	2-4	0,2-0,4	Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Oignon, poireau	2-3	0,2-0,3	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme, poire	3-6	0,3-0,6	Après l'apparition des feuilles, répéter après 14 jours au besoin.
Pomme de terre	2-5	0,2-0,5	2 ou 3 semaines après l'émergence, répéter après la floraison.
Soya, haricot, pois	2-4	0,2-0,4	Stade 2 ou 3 feuilles, répéter plus tard au besoin.
Tomate, poivron, aubergine	2-5	0,2-0,5	7 jours après la transplantation, répéter à intervalle de 14 jours au besoin.
Vigne	2-5	0,2-0,5	2 semaines avant la floraison.

Agro-Mn™

8-0-0 + 6% Mn
+ 0.5% Fe + 3.5% S

Agro-Mn is a liquid nutrient designed for soil and foliar applications in order to prevent and treat manganese deficiencies. Manganese is complexed with organic acids found in the plant, providing this product with a great capacity of absorption and mobility in the plant. **Agro-Mn** is reinforced with iron, nitrogen and sulphur in order to maximize photosynthesis, biomass production and yields. It can be applied on every crop based on soil and tissue analyses or as soon as deficiency symptoms appear. For more information on **Agro-Mn**, consult your agricultural representative.

Apply at suggested rates. Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre).

Guaranteed minimum analysis

Total nitrogen (N)	8%	Iron (Fe) (actual)	0.5%
Manganese (Mn) (actual)	6%	Sulphur (S)	3.5%

Rate US gallon/acre		Application timing and remarks
Rate L/ha		
Crops		

Soil application

All	5-10	0.5-1.1
Apply in strip at planting or shortly after. Water volume: 50 L/ha (5.5 US gallons/acre).		

Foliar application

Crops	Rate L/ha	Rate US gallon/acre	Application timing and remarks
Apple, pear	3-6	0.3-0.6	After leaf emergence, repeat 14 days later if needed.
Blueberry, cranberry	3-6	0.3-0.6	After leaf emergence, repeat 14 days later if needed.
Broccoli, cabbage, cauliflower	2-5	0.2-0.5	7 days after transplantation, repeat at 14-day intervals if needed.
Carrot	2-3	0.2-0.3	2 or 3 weeks after emergence, repeat 14 days later if needed.
Celery, lettuce, spinach	2-5	0.2-0.5	7 days after transplantation, repeat at 14-day intervals if needed.
Corn	2-4	0.2-0.4	2- to 3-leaf stage, repeat later if needed.
Cucumber, squash, melon, cantaloupe	2-5	0.2-0.5	7 days after transplantation, repeat at 14-day intervals if needed.
Onion, leek	2-3	0.2-0.3	2 or 3 weeks after emergence, repeat 14 days later if needed.
Potato	2-5	0.2-0.5	2 or 3 weeks after emergence, repeat after flowering.
Soybean, bean, pea	2-4	0.2-0.4	2- to 3-leaf stage, repeat later if needed.
Strawberry, raspberry	2-4	0.2-0.4	After leaf emergence, repeat 14 days later if needed.
Tomato, pepper, eggplant	2-5	0.2-0.5	7 days after transplantation, repeat at 14-day intervals if needed.
Vine	2-5	0.2-0.5	2 weeks before flowering.
Wheat, barley, oats	2-4	0.2-0.4	At tillering, repeat 14 days later if needed.

Agro-Mn™

8-0-0 + 6% Mn
+ 0,5% Fe + 3,5% S

Agro-Mn es un nutriente líquido pensado para aplicar en el suelo y en las hojas para prevenir y tratar las carencias de manganeso. El manganeso se asocia con los ácidos orgánicos que hay en la planta, lo cual da al producto un gran poder de absorción y circulación en la planta. **Agro-Mn** está reforzado con hierro, nitrógeno y azufre para maximizar la fotosíntesis, la producción de biomasa y el rendimiento. Se puede utilizar en todos los cultivos a partir de análisis del suelo y de los tejidos o de la aparición de síntomas de carencias. Para más información sobre **Agro-Mn**, consulte a su representante agrícola.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	8 %	Hierro (Fe) (real)	0,5 %
Manganeso (Mn) (real)	6 %	Azufre (S)	3,5 %

Dosis gallon US/acre		Momento de aplicación y observaciones
Dosis L/ha		
Cultivos		

Aplicación al suelo

Todos	5-10	0,5-1,1
Aplicar en banda durante la plantación o poco después de la plantación. Volumen de agua: al menos 50 L/ha (5,5 galones US/acre).		

Aplicación foliar

Cultivos	Dosis L/ha	Dosis gallon US/acre	Momento de aplicación y observaciones
Apio, lechuga, espinacas	2-5	0,2-0,5	7 días después del trasplante; repetir en intervalos de 14 días de ser necesario.
Arándano, arándano rojo	3-6	0,3-0,6	Después de la aparición de las hojas; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Brócoli, col, coliflor	2-5	0,2-0,5	7 días después del trasplante; repetir en intervalos de 14 días de ser necesario.
Cebolla, puerro	2-3	0,2-0,3	2 o 3 semanas después de surgir; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Fresa, frambuesa	2-4	0,2-0,4	Después de la aparición de las hojas; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Maíz	2-4	0,2-0,4	Estadio de 2 o 3 hojas; repetir posteriormente de ser necesario.
Manzana, pera	3-6	0,3-0,6	Después de la aparición de las hojas; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.
Papa	2-5	0,2-0,5	2 o 3 semanas después de surgir; repetir después de la floración.
Pepino, calabaza, melón, cantalupo	2-5	0,2-0,5	7 días después del trasplante; repetir en intervalos de 14 días de ser necesario.
Soya, frijol, chícharo	2-4	0,2-0,4	Estadio de 2 o 3 hojas; repetir posteriormente de ser necesario.
Tomate, pimiento, berenjena	2-5	0,2-0,5	7 días después del trasplante; repetir en intervalos de 14 días de ser necesario.
Trigo, cebada, avena	2-4	0,2-0,4	En el amacollamiento; repetir 14 días después de ser necesario.
Viña	2-5	0,2-0,5	2 semanas antes de la floración.
Zanahoria	2-3	0,2-0,3	2 o 3 semanas después de surgir; repetir al cabo de 14 días de ser necesario.