

Mélange et application. Bien agiter avant de verser. Remplir le réservoir aux trois quarts. Démarrer l'agitation et ajouter le produit. Rincer les contenants vides et ajouter l'eau de rinçage au réservoir. Ajouter le reste de l'eau et appliquer sans tarder. Ne pas épandre ce produit sur le feuillage des cultures sous des conditions desséchantes et si la température est supérieure à 25 °C ou s'il y a risque de fortes précipitations dans 24 heures suivant le traitement.

Compatibilité. Ce produit est compatible avec la plupart des produits agrochimiques. Kali-T a un pH de 12. Ne pas le mélanger directement avec les produits acides ou des oligoéléments non chélatés pour éviter la formation des sels de silicate. Ne pas appliquer avec les produits très riches en cuivre. Lire les recommandations des autres produits. Vérifier la compatibilité avant de mélanger en réservoir ou consulter votre représentant. **Vérifier la compatibilité de la façon suivante.** Dans un récipient transparent propre, ajouter l'eau et les produits à combiner, un à un, en agitant doucement, dans la même proportion que pour l'application. Laisser reposer la solution pendant 30 minutes. Des produits incompatibles produiront une solution laiteuse, floconneuse ou un précipité. Aussi, une séparation du liquide peut se former dans le contenant. Ne pas appliquer en cas d'incompatibilité.

Mixing and application. Shake well before using. Fill the tank three quarters full. Start agitation and add product. Clean the empty containers and add the rinsing water to the tank. Add the rest of the water and apply without delay. Do not spread this product on the culture's foliage under drying conditions and if temperature is 25 °C or higher or if there is a risk of high precipitations in the 24-hour period following treatment.

Compatibility. This product is compatible with most agrochemical products. Kali-T has a pH of 12. Do not mix directly with acid products or with non-chelated micronutrients to avoid the formation of silicate salts. Do not apply with products highly-rich in copper. Read other products recommendations. Check compatibility before mixing in application tank or check with your distributor. **Check compatibility as follow.** In a clean, transparent jar, add the water and other products, one by one in the same proportion as proposed application. Agitate gently. Let the jar sit for 30 minutes. Incompatible products will form flakes, sludge, gels or other precipitates. Separation or layering may appear. Do not apply in case of incompatibility.

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. No ponga este producto en las hojas en condiciones de sequedad y si la temperatura es superior a 25 °C o si hay riesgo de precipitaciones intensas durante las siguientes 24 horas.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Kali-T tiene un pH de 12. No debe mezclarse directamente con los productos ácidos u oligoelementos no quelatos para evitar la formación de sales de silicato. No debe aplicarse con productos muy ricos en cobre. Lea las indicaciones de los otros productos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad

PELIGRO

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Provoca lesiones graves en el tracto respiratorio. Puede ser corrosiva para los metales. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.



Prevenición: Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Conservar únicamente en el embalaje original. No respire la niebla, los vapores y el aerosol. Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. Lávese bien las manos después de la manipulación y cualquier otra parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta al producto.

Intervención: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con

Entreposage. Craint le gel.

Avertissement. Ce produit ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s'il est mal utilisé. Les traitements foliaires n'apportent aux plantes qu'une fraction des nutriments nécessaires à toute bonne production. Ce produit doit donc être utilisé comme complément à un programme de fumure de base établi en fonction des analyses du sol et/ou des tissus végétaux. NE PAS appliquer près des cours d'eau. NE PAS mélanger avec les produits acides.

Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L'acheteur sera alors responsable de tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l'usage ou du traitement de ce produit et accepte donc les conditions stipulées.

Storage. Avoid freezing.

Caution. This product must be used as stated by this label. It may prove harmful when misused. Foliar treatments supply plants with only a fraction of the nutrients required to any good production. This product must therefore be used as complement to a soil fertilization program based on soil and tissue analyses. DO NOT use near water streams or ponds. DO NOT use with acidic products.

Guarantee. The vendor's liability will be limited to the terms of this label. The buyer will then be responsible for all risks and damages to persons or properties resulting from the use of this product, and hereby accepts these conditions.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este producto se debe emplear únicamente de la manera recomendada. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Los tratamientos foliares sólo aportan a las plantas una parte de los nutrientes necesarios para una buena producción. Por lo tanto, este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales. NO aplicar cerca de corrientes de agua. NO mezclar con productos ácidos.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Absorber el vertido para prevenir daños materiales.

Almacenamiento: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente... con revestimiento interior resistente. Guardar bajo llave.

Eliminación: Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales y/o internacionales.

NO REUTILICE EL CONTENEDOR
MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



www.agro-100.com

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4 T 450 759-8887



Kali-T™/MC

2-0-24

Nutriments foliaires Foliar Nutrient Nutriente foliar



Nutriments foliaires / Foliar Nutrient / Nutriente foliar

2-0-24

ANGER

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Provoque des lésions graves des voies respiratoires. Peut être corrosif pour les métaux. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.



Prévention: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs et aérosols. Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et du visage. Se laver soigneusement les mains après manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été exposée au produit.

Intervention: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS D'EXPOSITION prouvée ou suspectée: Demander un avis médical. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Stockage: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur.

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER

Causes severe skin burns and eye damage. Causes serious injury to the respiratory tract. May be corrosive to metals. Suspected of damaging fertility or the unborn child.



Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep only in original packaging. Do not breathe mist, vapors and spray. Wear protective gloves, protective clothing, eye and face protection. Wash hands thoroughly after handling and any other part of the body that may have been exposed to the product.

Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a doctor. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice. Wash contaminated clothing before reuse. Absorb spillage to prevent material-damage.

Storage: Store in a corrosive resistant container with a resistant inner liner. Store locked up.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with local, regional, national and/or international regulations in force.

DO NOT REUSE CONTAINER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

versión
en español
en el interior

Fabricant • Manufacturer • Fabricante
Agro-100 ltée, 990, chemin des Prairies,
Joliette (Québec) Canada J6E 0L4



Kali-T™

2-0-24

Kali-T est un nutriment foliaire à teneur très élevée en potassium conçu pour prévenir et corriger les carences de cet élément et améliorer la qualité des récoltes. De plus, **Kali-T** contient de l'azote nécessaire au développement végétatif idéal et à une productivité élevée. **Kali-T** renferme aussi des silicates qui stimulent des mécanismes de défense contre différents stress abiotiques chez la plante. **Kali-T** est indiqué pour toutes les cultures et il doit être appliqué sur la base d'analyses de sol et de tissus, à l'apparition de symptômes de carences ou si un risque de stress est élevé. Pour plus d'information sur **Kali-T**, consulter votre représentant agricole.

Appliquer la dose suggérée. Volume d'eau: au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre) pour les grandes cultures et maraîchères, 1000 L/ha (100 gallons/acre) pour les petits fruits et arbres fruitiers.

Analyse minimale garantie

Azote total (N)	2 %	Potasse soluble (K ₂ O)	24 %
-----------------	-----	------------------------------------	------

Dose gallon US/acre	Moment d'application et remarques
Dose L/ha	
Cultures	

Application foliaire			
Arbres fruitiers tropicaux	5-10	0,5-1,1	À l'apparition des premiers fruits.
Asperge	2,5-5	0,3-0,5	3 à 4 semaines après la récolte, répéter 3 semaines plus tard. Ne pas appliquer sur les plantes sèches.
Betterave	8-12	0,9-1,3	Au stade de 16 feuilles.
Céleri, laitue, épinard	4-10	0,4-1,1	Deux semaines avant la récolte.
Courge, melon, cantaloup	4-10	0,4-1,1	À la floraison, répéter 2-3 semaines plus tard au besoin.
Crucifères	4-7	0,4-0,7	Formation des têtes, répéter 2-3 semaines plus tard au besoin.
Cultures fourragères	2,5-5	0,3-0,5	Appliquer au printemps pour stimuler la croissance et répéter après chaque coupe.
Fraise, framboise, bleuet, canneberge	4-12,5	0,4-1,3	Bouton vert, répéter aux 10 jours.
Mais sucré, maïs grain, blé, orge, avoine	3-7,5	0,3-0,8	À l'apparition du premier nœud.
Oignon, ail	4-10	0,4-1,1	Quand le feuillage est développé pour intercepter la pulvérisation.
Plantes à fleurs	3-7,5	0,3-0,8	À l'apparition des fleurs. Pour les plantes d'intérieur et de serre, mettre 100 ml dans 10 L et pulvériser.
Pomme, poire	4-7,5	0,4-0,8	Débourrement.
Pomme de terre	4-10	0,4-1,1	Après la floraison, répéter 2-3 fois à un intervalle de 7 jours.
Soya, haricot, pois	4-7,5	0,4-0,8	Au besoin.
Tabac	7,5	0,8	Lorsque la carence est diagnostiquée.
Tomate, poivron, aubergine	4-7,5	0,4-0,8	À l'apparition des premiers fruits.
Vigne	3-5	0,3-0,5	Dès la nouaison. À intervalle de 10 à 14 jours, au besoin.

Fertirrigation

Toutes	La dose optimale varie selon la culture, le sol et la teneur du sol en potassium. Pour des résultats optimaux, faire une analyse de sol et de tissus végétaux au préalable. Ne pas dépasser 20 L/ha/application.
--------	--

Protection contre le gel

Toutes	Appliquer de 4-10 L/ha dans les 36 heures avant le gel.
--------	---

Kali-T™

2-0-24

Kali-T is a high potassium content liquid nutrient designed to prevent and rectify deficiencies in potassium and improve crop quality. Also, **Kali-T** contains nitrogen which is required for vegetative development and high productivity. **Kali-T** also contains silicates that stimulate defense mechanisms against different types of abiotic stress affecting the plant. **Kali-T** is indicated for every crop and it must be applied based on soil and tissue analyses or as soon as deficiency symptoms appear or if stress risk is high. For more information on **Kali-T**, consult your agricultural representative.

Apply at suggested rates. Water volume: at least 200 L/ha (21.5 gallons/acre) for arable and vegetable crops, 1000 L/ha (100 gallons/acre) for small fruits and fruit trees.

Guaranteed minimum analysis

Total nitrogen (N)	2%	Soluble potash (K ₂ O)	24%
--------------------	----	-----------------------------------	-----

Rate US gallon/acre	Application timing and remarks
Rate L/ha	
Crops	

Foliar application			
Apple, pear	4-7.5	0.4-0.8	At bud burst.
Asparagus	2.5-5	0.3-0.5	3 to 4 weeks after harvest, repeat 3 weeks later. Do not apply on dry plants.
Beet	8-12	0.9-1.3	At the 16-leaf stage.
Celery, lettuce, spinach	4-10	0.4-1.1	2 weeks before harvest.
Crucifers	4-7	0.4-0.7	Head formation, repeat 2-3 weeks later if needed.
Flower plants	3-7.5	0.3-0.8	When flowers appear. For interior and greenhouse plants, put 100 mL in 10 L and spray.
Forage	2.5-5	0.3-0.5	Apply in the spring to stimulate growth and repeat after each cut.
Onion, garlic	4-10	0.4-1.1	When foliage is large enough to intercept spray.
Potato	4-10	0.4-1.1	After flowering, repeat 2-3 times at 7-day intervals.
Soybean, bean, pea	4-7.5	0.4-0.8	If needed.
Squash, melon, cantaloupe	4-10	0.4-1.1	At flowering, repeat 2-3 weeks later if needed.
Strawberry, raspberry, blueberry, cranberry	4-12.5	0.4-1.3	Every 10 days starting at the green bud stage.
Sweet and grain corn, wheat, barley, oats	3-7.5	0.3-0.8	At first node.
Tobacco	7.5	0.8	When deficiency is diagnosed.
Tomato, pepper, eggplant	4-7.5	0.4-0.8	When first fruits appear.
Tropical fruit trees	5-10	0.5-1.1	When first fruits appear.
Vine	3-5	0.3-0.5	At fruit set. Repeat at 10- to 14-day intervals, if needed.

Fertigation

All	Optimum rate of application varies according to crop, soil, and soil potassium content. For best results, follow recommendations from soil and plant tissue analyses. Do not exceed 20 L/ha/application.
-----	--

Protection against frost

All	Apply 4-10 L/ha 36 hours before frost.
-----	--

Kali-T™

2-0-24

Kali-T es un nutriente foliar con alto contenido de potasio, pensado para prevenir y corregir las carencias de este elemento y mejorar la calidad de las cosechas. Además, **Kali-T** contiene el nitrógeno necesario para un desarrollo vegetativo y una productividad alta. **Kali-T** también contiene silicatos que estimulan mecanismos contra distintos tipos de estrés abiótico de la planta. **Kali-T** está indicado para todo cultivo y debe ser aplicarse a partir del análisis del suelo y de los tejidos, de la aparición de síntomas de carencias o si hay un riesgo elevado de estrés. Para más información sobre **Kali-T**, consulte a su representante agrícola.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre) para los grandes cultivos y huertos, 1000 L/ha (100 galones/acre) para los frutos pequeños y los árboles frutales.

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	2%	Potasa soluble (K ₂ O)	24%
---------------------	----	-----------------------------------	-----

Dosis galón US/acre	Momento de aplicación y observaciones
Dosis L/ha	
Cultivos	

Aplicación foliar			
Apio, lechuga, espinacas	4-10	0,4-1,1	Dos semanas antes de la cosecha.
Árboles frutales tropicales	5-10	0,5-1,1	Al aparecer los primeros frutos.
Betabel	8-12	0,9-1,3	En la etapa de 16 hojas.
Calabaza, melón, cantalupo	4-10	0,4-1,1	En la floración; repetir 2 o 3 semanas después, de ser necesario.
Cebolla, ajo	4-10	0,4-1,1	Cuando las hojas se hayan desarrollado lo suficiente para retener la pulverización.
Crucíferas	4-7	0,4-0,7	Formación de cabezas; repetir 2 o 3 semanas después, de ser necesario.
Cultivos forrajeros	2,5-5	0,3-0,5	Aplicar en primavera para estimular el crecimiento y repetir después de cada corte.
Espárrago	2,5-5	0,3-0,5	3 a 4 semanas después de la cosecha; repetir 3 semanas después. No aplicar en las plantas secas.
Fresa, frambuesa, arándano, arándano rojo	4-12,5	0,4-1,3	Botón verde, repetir cada 10 días.
Maíz dulce, maíz en grano, trigo, cebada, avena	3-7,5	0,3-0,8	Cuando aparece el primer nudo.
Manzana, pera	4-7,5	0,4-0,8	Al desbrote.
Papa	4-10	0,4-1,1	Después de la floración, repetir de 2 a 3 veces a un intervalo de 7 días.
Plantas con flores	3-7,5	0,3-0,8	Al aparecer las flores. Para las plantas de interior y de invernadero, póngase 100 ml en 10 L y pulverizar.
Soya, frijol, chícharo	4-7,5	0,4-0,8	Cuando sea necesario.
Tabaco	7,5	0,8	Al detectarse la carencia.
Tomate, pimiento, berenjena	4-7,5	0,4-0,8	Al aparecer los primeros frutos.
Viña	3-5	0,3-0,5	A partir del cuajado. Repetir a un intervalo de 10 a 14 días, si es necesario.

Fertirrigación

Todos	La dosis ideal varía según el cultivo y el suelo, dependiendo del contenido de potasio de este último. Para obtener resultados óptimos, realice análisis previos del suelo o de los tejidos vegetales. No sobrepasar 20 L/ha/aplicación.
-------	--

Protección contra las heladas

Todos	Aplicar de 4-10 L/ha durante las 36 horas anteriores a la helada.
-------	---