ACTIVÉ PAR/ACTIVATED BY/ACTIVADO POR

Oligo Prime

Agro-B™/MC

4-0-0 + 10% B

Agro 100 cultivando la innovación

B enhanced mobility

Nutriente Vegetal

para uso en fertirriego y foliar

Agro-B movilidad ies un nutriente líquido concentrado rico en boro pensado para prevenir y corregir las carencias. Una buena nutrición con boro favorece el crecimiento de la planta, la polinización y la asimilación de los otros nutrientes. **Agro-B movilidad** contiene sorbitol, un osmoregulador procedente de la planta y metabolizable directamente, que forma complejos estables y solubles con el boro para una absorción óptima por las hojas, una translocación rápida que facilita la movilidad del boro y su disponibilidad para todas las partes de la planta. **innovadora tecnología bioestimulante Oligo® Prime,** que refuerza las defensas naturales y la respuesta adaptativa de las plantas al estrés abiótico (falta de agua, baja temperatura, salinidad). Puede aplicarse en las hojas o en el suelo a partir del análisis del suelo y de los tejidos o cuando aparecen síntomas de carencia. Para más información sobre **Agro-B movilidad,** consulte a su representante agrícola.

ventajas agronómicas

- Mejor fuente de boro en aplicación foliar
- Viabilidad del polen y buena polinización
- Buen desarrollo de los frutos
- Estabilidad de las paredes celulares
- Formación y transporte de azúcares
- Asimilación y movilidad del calcio
- Asimilación del nitrógeno
- Mejor calidad de los frutos
- Resistencia a las enfermedades (fusariosis, verticilosis, virus) y a los insectos

densidad **1,340 kg/L**

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N)	4%	Acido Salicílico	0.1%	Ácido fúlvico (derivado de la leonardita)	0.1%
Boro (B) (real)	10%	Quitosano	0.1%	Materia orgánica (derivada de la leonardita)	0.03%
				Sorbitol	5%

Dosis galón US/acre / Dosis L/ha			Momento de aplicación y observaciones
Cultivos			
Aplicación foliar			
Alfalfa	1-3	0.1-0.3	Después de cada corte
Arándano, arándano rojo	2	0.2	Justo antes de la floración (botón rosada). En post-cosecha, aplicar 2 L/ha tras la cosecha, antes de que se caigan las hojas.
Betabel	3	0.3	Entre 3 y 6 hojas.
Calabaza, pepino, melón, cantalupo	2	0.2	En la etapa de 4 hojas.
Cánola, mostaza	2	0.2	En la etapa de elongación del tallo. Repita, según sea necesario, cuando los botones florales estén cerrados
Crucíferas	3-4	0.3	Entre 4 y 6 hojas.
Espárragos	2.5-5	0.3-0.5	Antes de la senescencia de las hojas.
Fresa, frambuesa	2	0.2	Prefloración. Reducir la dosis a menos de 0,2 L/ha (2,8 oz/acre) durante la floración.
Maíz dulce, maíz en grano	2-3	0.2-0.3	En el estadio de 4 a 6 hojas
Manzana, pera	2-3	0.2-0.3	De la etapa de prefloración a la de cáliz. En post-cosecha, aplicar 2 L/ha tras la cosecha, antes de que se caigan las hojas.
Papa	1	0.1	14 días después de la emergencia.
Soya, frijol	2	0.2	Las plantas miden entre 5 y 15 cm (4" y 6").
Tomate, pimiento, berenjena	2	0.2	Entre 4 y 6 hojas.
Trigo, cebada, avena	2	0.2	En el amacollamiento.
Viña	2	0.2	En el desborre, prefloración y cuajado. En post-cosecha, aplicar 2 L/ha tras la cosecha, antes de que se caigan las hojas.
Zanahoria	3	0,3	Las plantas miden entre 10 y 15 cm (4" y 6").

Repetir cada 10 o 14 días, según se necesite. No hacer más de una aplicación cuando se han utilizado de 3 a 4 L de **Agro-B** por hectárea(0,3-0,4 galones US/acre). No utilizar este producto cuando la coloración y la madurez de los frutos pueden retrasarse por la aplicación de nitrógeno.

Fertirrigación

Consulte a su asesor para la dosis apropiada

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

Mezcla y aplicación. Mezcla y aplicación. Agitar bien el envase antes de usar. Llenar tres cuartos del tanque. Encender el agitador yagregar el producto. Enjuagar los recipientes vacíos y añadir el agua de enjuage al tanque. Agregue el resto delagua y póngase sin esperar. Para lograr mejores resultados, póngase por la mañana temprano o al final de latarde. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de locontrario podrían producirse daños en los cultivos.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes líquidos, excepto con el calcio. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad. **Almacenamiento y eliminación.** Evitar la congelación. Al almacenar no sobreponer más de tres contenedores. **Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.**. Mantener el contenedor bien cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No aplicar directamente en corrientes de agua o estanques. No contaminar el aguaal enjuagar el equipo o al eliminar los desechos.

Seguridad. Usar siempre el equipo adecuado para la protección de manos y ojos durante el manejo del producto. **En caso de contacto con los ojos,** enjuagar con agua abundante y consultar al médico. **En caso de contacto con la piel,** lavar con agua limpia. **IEn caso de ingestión, si la persona está consciente,** darle dos vasos de agua, inducir el vómito y consultar al médico.

Advertencia. Este producto contiene boro y debe ser utilizado de la manera recomendada. Mal utilizado puede sernocivo. Sustancia que puede ser perjudicial para la fertilidad o para el feto.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsablede todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

2023_04