

ACTIVÉ PAR/ACTIVATED BY/ACTIVADO POR

Oligo Prime[®]

Agro-Moly^{TM/MC}



4-0-0 + 4% Mo

Nutriente líquido



cultivando la **innovación**

Agro-Moly es un nutriente líquido pensado para prevenir y tratar las carencias de molibdeno. El molibdeno es un componente de las enzimas que convierte los nitratos en amoníaco y luego en aminoácidos. Es necesario para las bacterias que fijan el nitrógeno en las leguminosas. El molibdeno también interviene en la asimilación del fósforo y del hierro. **Agro-Moly** es activado por **Oligo Prime**[®], una innovadora tecnología bioestimulante que permite una rápida absorción y translocación de nutrientes y refuerza las defensas naturales de la planta frente a estreses abióticos (sequía, baja temperatura, salinidad, etc.). Se debe utilizar a partir del análisis del suelo o de los tejidos o de la aparición de síntomas de carencias. Para más información sobre **Agro-Moly**, consulte a su asesor agronómico.

beneficios agronómicos

- Mejora la utilización del nitrógeno por parte de la planta
- Ayuda a la formación de nódulos en las leguminosas
- Mejora la utilización del fósforo y del hierro
- Asegura los rendimientos

densidad **1,105 kg/L**

Análisis mínimo garantizado

Nitrógeno total (N) 4 % nitrógeno soluble en agua	4 %	Extracto de corteza de sauce	0,1 %
Molibdeno (Mo) (real)	4 %	Ácido fúlvico (derivado de la leonardita)	0,12 %
		Quitosano	0,1 %
		Sustancias húmicas (derivadas de la leonardita)	0,03 %

Dosis galón US/acre

Dosis L/ha

Cultivos

Cultivos	Dosis L/ha	Dosis galón US/acre
Apio	1-2	0,1-0,2
Colza, mostaza	1,5	0,2
Crucíferas	0,75-1,5	0,08-0,2
Cultivos forrajeros/alfalfa	1-2	0,1-0,2
Durazno, ciruela, nectarina	0,5-1,5	0,05-0,2
Espárrago	1-2	0,1-0,2
Fresa	1-2	0,1-0,2
Manzana, pera	1,5-2	0,2
Melón, zapallito	1-2	0,1-0,2
Papa	0,5-1,5	0,05-0,2
Pepino	1,5-3	0,2-0,3
Soya, frijol, chícharo	1,5-3	0,2-0,3
Tomate	1-2	0,1-0,2
Viña	1,5-3	0,2-0,3

Aplicación foliar

Momento de aplicación y observaciones

Estadio de 4 a 5 hojas.
Estadio de 4 a 6 hojas.
Estadio de 4 a 5 hojas.
En las plantas jóvenes (15 cm de altura).
Con la reanudación de la vegetación (en las hojas jóvenes).
Cuando aparecen los síntomas.
Desde la reanudación de la vegetación al final del invierno.
Con la reanudación de la vegetación (en las hojas jóvenes).
Estadio de 4 a 5 hojas.
Estadio de 4 a 5 hojas.
Estadio de 4 a 5 hojas.
En las plantas jóvenes (15 cm de altura).
Estadio de 4 a 5 hojas.
Con la reanudación de la vegetación (en las hojas jóvenes).

En caso de carencia seria, repetir cada 10 o 14 días. No hacer más de 2 aplicaciones cuando se han utilizado 3 L/ha (0,3 galones US/acre) de Agro-Moly.

Aplicación en el suelo

Consulte a su asesor agronómico sobre la dosis adecuada para sus condiciones.

Nota: el exceso de molibdeno en el forraje puede ser tóxico para los rumiantes.

Aplicar la dosis sugerida. Volumen de agua: por lo menos 200 L/ha (21,5 galones/acre).

modo de empleo

Mezcla y aplicación. Agitar bien antes de verter. Llenar el depósito a tres cuartos. Iniciar la agitación y agregar el producto. Enjuagar los contenedores vacíos y agregar el agua de enjuagado al depósito. Agregar el resto del agua y aplicar de inmediato. Para obtener mejores resultados, aplicar temprano en la mañana o tarde en la noche. No aplicar en condiciones de sequedad y cuando la temperatura exterior sea demasiado alta, ya que de lo contrario podrían producirse daños en los cultivos.

Mezcla en tanque. En algunos casos, la mezcla en tanque con productos para el control de plagas puede generar incompatibilidades físicas y químicas que pueden afectar la eficacia del producto y el rendimiento del cultivo. Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la mezcla del tanque. Consulte con los representantes de los fabricantes de pesticidas y un representante de Agro-100 para ayudar a determinar la seguridad y los resultados agronómicos de la mezcla.

Compatibilidad. Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos. Verificar la compatibilidad antes de mezclarlo en el depósito o consultar a su representante. **Verificar la compatibilidad de la manera siguiente:** En un recipiente transparente y limpio, agregar el agua y los productos que se van a mezclar, uno por uno, agitando suavemente, en la misma proporción que para la aplicación. Deje reposar la solución durante 30 minutos. Los productos incompatibles pueden reaccionar formando una solución lechosa, copos o un precipitado. También podría formarse una separación del líquido en el contenedor. No utilizar en caso de incompatibilidad.

Almacenamiento. Evitar la congelación.

Advertencia. Este fertilizante contiene molibdeno y debe usarse solo como se recomienda. Puede ser nocivo si no se emplea adecuadamente. Los cultivos ricos en molibdeno (Mo) son tóxicos para los rumiantes. Este producto contiene mariscos. Pueden producirse reacciones adversas en personas sensibles. En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Utilizar una máscara antipolvo y guantes de protección. En caso de reacción alérgica, consulte a un médico. Este producto debe utilizarse como complemento de un programa básico de fertilización del suelo con arreglo a los análisis del suelo y/o de los tejidos vegetales.

Garantía. La garantía del vendedor estará limitada a las condiciones de esta etiqueta. El comprador será responsable de todos los riesgos y daños, ocasionados a personas o propiedades, que resulten del uso o tratamiento de este producto y acepta por lo tanto las condiciones estipuladas.

1 866 770.8887 • www.agro-100.com